## Stauden Sämerelen eigener Ernte von 1949

Karl Foerster, Potsdam - Bornim, Am Raubfang

Züchtungs- und Forschungsbetrieb winterharter Blütenstauden

Fernruf: Potsdam 6210

Der neue
Pflanzenkatalog
1 9 50
geht Ihnen auf
Wunsch ab Mitte
Februar zu.

Hauptbedingung für Erfolge der Stauden-Heranzucht aus Samen ist der Schutz vor Sonnenbestrahlung und Austrocknung des Bodens. Wer kein Frühbeet hat, kann sich mit flachen Gruben helfen, auf welche Kistendeckel gelegt werden. Erst wenn alles kräftig keimt, entfernt man diese.

Eine Liste langjähriger Sondererfahrung in der Sämlings-Heranzucht von Stauden in übersichtlichen Zusammenfassungen wird auf Wunsch zuges sandt. Bei manchen Stauden ist Geduld vonnöten, sie brauchen zum Keimen oft mehr als 4 Wochen. (Helenium) Namensorten fallen nicht echt aus Samen, werden aber recht oft von einzelnen Sämlingen noch übertroffen.

+++++++++++	
	10 g Pt.
Althaea ficifolia, Staudenmalve, einfachbl., mannshoch	3.00 0,25
Alyssum rostratum, Sommersteinnich, goldgelb, fußhoch	2,80 0,25
Anemone pulsatilla, violette silberbehaarte Küchenschelle	1
Aquilegia vulgaris, bunte kurzspornige Akelei in Mischg.	2,20 0,30
fl.pl., wie vorige, gefüllt	2,80,0,50
Armeria formosa gigantea, großköpfige Grasnelke in bun- tem Farbenspiel, bis kniehoch	8 40,80
Aster amellus,  Berg-Herbstaster, kniehoch, in Farbtönen von hellsten Silberlila über Rosa, Rot bis zum tiefsten Lilavio- lett	4.00 0,60
- novi-belgii, hüftheche, glattblättrige Stauden- Herbstaster in Sortens	
Oktoberfest, hijfthoch, tiefblau, festger	
baut. Rosenquarz, brusthoch, Rosenquarzfarbe	
Mount Everest, brusthoch, weiß, großblumig	
Snowdrift, hufthoch, schneeweiß Taubenblau, huft/brusthoch, silberblau	
festgebaut  in diesen Sorten gesondert  Mischung erprobter bester Sorten	6,00 0,40 3,00 0,25
- noavae-angliae, brusthoche Rauhblatt-Aster in Rosa Rot, Violettblau, Mischung erprobter bester Sorten	8,00 0,50

	×3 2 50		1 g'	10	Pt.
	Zwerg-Herbstas	ter, fuß-bis kniehoch			AL LINE SECTION OF THE PERSON OF
	Lilac-Time, le Oktoberschneek	uchtend lilablau) uppel, schneeweiß) , schneeweiß	1		0,60
	Filigrandol den	in grunem Netzwerk	0,60		0,40
Campanula carpathic	a, Karpathen-G Mischung blau-	Nockenblume, fußhoch, weißer Farben		2,80	0,50
- persicifol	ie. pfirsichbl kniehoch, Misch	ättrige Glockenblume ung blau-weißer Farber			0,60
Carlina caulescens	stricta, Silbe	erdistel, fußhoch. Es			
		er Haltung, nicht am Bo-			1
Chrysanthemum uligi	nosum, ungaris Marguerite, Se	che brusthohe Sumpf-			0,50
Delphinium cultorum	Blaus hoher Qu standskraft. Au men zu ziehen.	alität und Wider- aßerst lohnend aus Sa- , In Sorten:			
- -	Fernzünder, mit telfrüh	ch, himmelblau, spät stelhoch, tiefblau, mit-			
	schwarz, mittel	n, hoch, enzianblau, und Lfrüh r Sorten ergibt einen			
Dianthus caesius,	besonders hohe	Prozentsatz schöner Qualitäten Soter Sorten spannhoch, zart-rosa		12	3.00
- cruentus,	santrete Blut	nelke, kniehoch, echt			1,50
Eryngium planum,		stahlblaue Mannstreu- hoch		0,90	0,20
Gaillardia regalis	Kokardenblume de knichohe S	, bekannte hervorragen chnittblume	-	4,40	0,35
- aristata na		en, fußhoch, daher auch		6	1
Helenium autumnale	Bornimer Züch	in Namensorten neuerer tungen, die zwar nie och interessante Ergeb	,		
Frühe Sc	rten (Ende Jul	i/Anf.August_erblühend	1)		-
Kupfarsprude	el, mannshoch,	rotbraun			
Rubinkuppel	11	samtdunkelbraun			1
		hellgelb	1		
Goldfuchs,	11	goldbraun .			
- Biedermeier,		zweifarbig gelb/braun			
Mahagoni,	\$1	rotbraun			
Karneol,	10	rostrot			

		10 g	Pt
	te Sorten (Mitte August erbleu.später:		
	, Sonnenberg, hüfthoch, gelb, braungesternt		
	ackzwerg, tischhoch, tief dunkelbraun		
	tsonne, brusthoch, hellgelb ot, braunrot		
Spätr			
ALUGO	ld hüfthoch, aprikosengelb in diesen Sorten gesondert		72
	schung erprobter bester Sorten ,	5,60	0,,0
Hellopsis scabra,	Sonnenauge, tisch/brusthoch, Bornimer neue Hybriden, Mischung, geldgelbe wertvolle, haltbare Schnittblume, unentbehrliche, langeblühende Rabattenund Gruppenstaude des Hochsommers	1	0.30
		1	0,30
	Bezüglich der Sorten gilt auch das von Helenium gesagte:		
-	Sommersonne, großblumig.goldgelb ) Spitzentänzerin, längstblühende )		
	Aller, tiefses Goldgelb )	3	0,80
	Goldgrünherz, gefüllte Blüten mit) grünen Ornamenten im schönsten Gelb)		
Hypericum olympicum	m, Hartheu, liebliches Steingartenge-		
	hölz mit leuchtend gelben Blüten,		0.50
Inula ensifolia,	goldgelber Zwerg-Alant, spannhoch, lan-		0,50
	geblühends		0,50
Lavandula vera,	echter Duft-Lavendel in winterhart er- probter Sorte, kniehoch,		0,40
Lavatera thuringia	ca, rosa Buschmalve, hüfthoher Dauer- blüher		0,50
Leucanthemum (Chry	santhemum maximum(, Riesenmarguerite härtester Herkunft	1,30	0,25
Linum perenne,	Staudenlein, knieboher, leuchtend blau-		
	er Dauerblüher	0,7	0,20
Lupinus polyphyllu	s, Staudenlupine, Mischung vieler neu- artiger Farben der Russell-Lupinen, gleich gut für Schnitt und Stauden-		
	pflanzung.	2,80	0,40
Lychnis chalcedoni	ca, Lichtnelke, húfthohe "Brennende Liebe", scharlachrot		0,25
Malva moschata,	Pappelmalve, knichoch, langeblühende Schnitt-, Wild- und Rabattenstaude.		0,80
Papaver orientale.	Riesenmohn, Mischung bester Namensort.		0,40
	lorum Mariesii, Ballonglocke, kniehohe clematishafte, unverwistliche Pracht-		
	staudesseesseesseesseessees	1	0,80
Rudbeckia Sullivan	tii, braungesternter Sonnenbut, gelb- braun, reich- und langeblühend, von ungewöhnlicher Wirkung, auch zum Schnitt fällt ECHT aus Semen! Stellt die alte		
	Rudbeckia speciosa völlig in den Schat- ten		ó,80

<u>1 g</u>	TO g	Pt
Savia nemorosa superban echter violettblauer Sommer- salbei, e.c.h t aus Samen!		0,80
- officinalis, Salbei, mit blauen oder rosa Blumen, bekannt als Thee und Würzsalbei	0,50	
Saponaria ocymoides, Seifenkraut, fußhoch, rosa, reichblühend, starkwüchsige Steingartenstaude  Satureia montana compacta, Bergminze, weißrosa Steingar	1,30	0,25
tonatoude		0,40
- pymaea lilacina, wie vorige lila, beide wert- voll durch spate Blüte		0,80
Sempavivum metallicum giganteum, Sandsteinrose; diese sowie die folgenden ergeben reizvolle Gebilde für Trockenmauern und Steinfugen		
ruthenicum, Fettblattsteinrose)		1
tectorum, Donnerwurz		
Mischung erprobter Sorten und Arten		0,50
Stachys lanata, Silberwollzwist, dicht silbergrau be- laubt, vielartig brauchbar im Garten, spannhoch	4,40	0,60
Thalictrum flavum, Blaublatt-Amstel, brusthoch, gelb- blühend	2,80	0,40
Verbascum clympicum, Königskerze, zweijährig; mannshoche, immer automatisch sich aussäende		
Prachtstaude.von.langer.Sommerblute- zeit. Gelbblühend	2,80	0,30
Veronica spicata, blauer Kerzen-Ehrenpreis, fuß-knie- hoch, in ausdauerndem Typ		0,30

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=

## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Marianne-Foerster-Stiftung
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)